



北方多地隐翅虫进入活跃期 市民需警惕“飞行的硫酸”

□晚报记者 时 晨

近期,北方多个城市陆续出现隐翅虫活动增多的情况,不少滨州居民在家中、小区绿化带、户外道路发现这种外形酷似蚂蚁、带有红黑相间纹路的小虫,部分市民因处置不当引发皮肤灼伤。隐翅虫被大众称为“飞行的硫酸”,本身不会主动叮咬人,但虫体破碎后释放的强酸性毒液,可造成皮肤急性炎症损伤。眼下正值隐翅虫高发活跃阶段,提醒市民提前防范、科学应对。

>>>夏秋夜间小虫频繁出现 市民误操作致皮肤受伤

“之前只在网上看到南方有这种虫子,没想到今年在家也碰到了。”居住在滨城区黄河一路一小区的市民吴先生向记者讲述,前几日夜里在家开灯休息,感觉颈部有东西爬动,下意识抬手一拍,没过多久,脖子就出现火辣辣的灼痛感。一开始以为只是普通蚊虫叮咬,直到脖子皮肤上出现条状红斑、水泡,又疼又烧。重新观察了一下窗户周围还在爬的虫子,才意识到是隐翅

虫,急忙前往就医。“医生说幸亏处理及时,没有抓挠或者挑破水泡,不然皮损范围会更大,恢复周期也会拉长。”

采访中,多名市民表示,并不了解隐翅虫的危险特性,遇到飞虫第一反应就是拍打,很容易造成意外的皮肤损伤。市民王先生在户外散步,发现手臂上附着一只隐翅虫。“当时没有直接用手拍,拿卫生纸轻轻把虫子拨落到地上了。后来新闻才知道,拍打是最

危险的行为,一旦拍碎虫子,毒液沾到皮肤上就会中招。”

还有一位学生家长表示,邻居家中招的不少,看小区群里总是发此类消息,物业虽然组织喷药了,但她还是感到有些恐慌:“家里孩子还小,皮肤娇嫩,最近我们一点窗户也不敢开,户外运动几乎全部取消,网购了驱虫用品,屋里消杀了多次,睡前还要抖一抖床单和晾晒的衣物,就怕虫子藏在里面伤到孩子。”



>>>虫落身上切勿拍打 记住正确急救步骤

如果隐翅虫落在皮肤上,首要原则是不要拍打、不要揉搓。市民可以轻轻把虫子吹走,或者用纸巾、卡片等物品轻轻拨开,保证虫体完整,避免毒液破裂释放。

一旦不慎拍碎虫体,毒液沾染皮肤,要立刻开展急救处理:第一时间使用大量流动清水冲洗接触部位,也可以使用肥皂水冲洗,持续冲洗15分钟左右,碱性肥皂水能够中和酸性毒液,减少腐蚀伤害;冲洗完成后,使用凉毛巾冷敷患处,减轻灼痛红肿。

专家提示,区分情况处置:仅出现轻微红斑、肿痛,可在专业指导下使用炉甘石洗剂、弱效抗炎药膏;如果已经出现水泡、破溃、流脓,不要自行挑破水泡,避免感染;若出现大面积皮损、面部或眼部受伤、发烧,或是疼痛难以忍受,不要继续居家处理,要尽快到医疗机构就诊。

另外要注意,接触过毒液的手,不要再触碰身体其他部位,防止毒液被带到面部、颈部等多处皮肤,造成多处皮炎。

>>>8至9月为隐翅虫活跃期 它趋光喜湿易入室内

相关专家介绍,隐翅虫并不是外来入侵物种,北方本地原本就存在种群,只是往年气候条件限制,数量偏少,不容易被居民发现。隐翅虫活跃具有极强的季节性,每年6月起虫体开始增多,8—9月是全年活动高峰期,到10月气温回落之后,活动量逐步下降。

隐翅虫偏好温暖潮湿的环境,适宜生存温度在20℃至

30℃,空气湿度较高时繁殖速度加快。今年入夏之后,本地降水偏多,雨后环境潮湿,加上城市绿化植被丰富,杂草、枯枝、积水角落,都成为隐翅虫栖息繁殖的场所。

该虫昼伏夜出,具备很强的趋光性。傍晚到夜间,室内灯光、路灯会吸引隐翅虫,虫子顺着门窗缝隙、破损纱窗飞入居民家中。隐翅虫外形细

长,红黑相间,体型接近蚂蚁,翅膀短小,爬行速度快,很多居民第一眼容易把它当成普通蚂蚁。专家着重强调,隐翅虫不会主动蜇咬人类,正常情况下虫子从皮肤表面爬过,并不会造成伤害。危险来源是虫体内含有的强酸性隐翅毒素,只有虫体被挤压、拍碎,毒液外流接触皮肤时,才会引发皮炎。

>>>隐翅虫体液具有腐蚀性 皮肤受伤有典型特征

隐翅虫体内的毒液pH值低,腐蚀性较强,也因此被俗称为“飞行的硫酸”。一旦毒液沾染皮肤,短时间内就会产生刺激反应,也就是隐翅虫皮炎。

相关专家介绍,接触毒液后的数小时内,接触部位会出现条状、线状、点簇状水肿性红斑,伴随灼热疼痛感,和普通蚊虫叮咬以瘙痒为主的感

受有明显区别。随着病情发展,红斑区域会长出脓,严重时出现皮肤糜烂、表皮破损。如果皮损面积较大,或是发生在眼睑、面部等皮肤薄弱位置,还会出现明显肿胀,部分人群伴随低热、局部淋巴结肿大。

多数轻症患者,规范护理之后,10到14天左右创面会逐步愈合。但愈合之后,局部

皮肤会留下色素沉着,需要数月慢慢淡化。如果发生抓破、继发感染,护理不当,还有留下疤痕的可能性。不少市民存在误区,认为涂抹牙膏、酱油、风油精、酒精可以缓解,专家提醒,尽量使用专业药物,这类偏方多会持续刺激破损皮肤,加重炎症反应,扩大损伤范围。

>>>做好物理阻隔预防 从源头减少入户风险

第一,检查家中纱门纱窗,及时修补破损孔洞,傍晚开灯时,尽量拉好窗帘,降低室内灯光对外的吸引力,夜间可以选择低亮度暖光光源。

第二,及时清理房屋周边杂草、枯枝、积水、废旧杂物,减少隐翅虫的栖息场所;定期清理室内地漏、墙角等阴暗潮湿缝隙,保持环境干燥。

第三,在草丛、绿化带、农田周边活动,尽量穿长袖长裤,可涂抹合规驱虫药剂。从室外晾晒收回衣物、床单

被褥前,先充分抖动,防止隐翅虫藏匿在织物之中。

第四,睡前养成检查习惯。简单查看床铺、枕头上是否附着小虫,有条件可以使用蚊帐。

隐翅虫虽有一定危害性,但只要掌握正确应对方法,不必过度恐慌。隐翅虫不会大范围主动攻击人群,绝大多数病例都是因为市民下意识拍打虫体,人为造成毒液释放引发损伤。一旦出现疑似隐翅虫皮炎的症状,及时就医处理,守护好自身皮肤健康。